



# Snoeien fruit

Workshop 23 januari 2019

ATV Utrecht Zuid



# Waarom snoeien?

- ‘onderhoud’ of ‘vorm’
- jong beginnen → kroon vormen
- beschadigingen → voorkomen ziekten
- afmeting → te groot, hinder omgeving
- verjongen → vorming van voldoende vruchthout

# Fruitbomen snoeien

- Zwakke groeier eerder snoeien dan sterke groeiers (maart)
- Niet snoeien bij vriezend weer
- Snoeien op droge dag
- Licht en lucht bevorderen in kroon.
- Let op: snoeien doet groeien!
- Veel bloesem en vrucht? --> oude boom die nauwelijks groeit
- Zomersnoei: bv het teveel aan steil hout



# Maatwerk

- Sterk groeiend, steile takken? → feb/mrt
- Kleinfruit direct na oogst → voorkomen plagen
- Vroeg snoeien geeft vroeg uitlopen; niet altijd handig
- Zomers snoeien remt groei, winters snoeien sterke groei



# Goed gereedschap

- Geschikt
- Links – of rechtshandig
- Schoon en scherp
- Uitschuifbaar
- Trap



GroenBlauw - kvk 5405 7795


# Bomen

- Hoogstam (stam ca 2m)
- Halfstam (stam 1m20)
- Laagstam (stam ca 50cm)
- Minitree (terras en balkon)



# De boom

- Onderstam, entplek, stam
- Hart- en gesteltakken
- Vruchthout
- Verlengingstak
- Concurrent



# Fruitsoorten

## PITVRUCHTEN:

- Appel (Malus)
- Peer (Pyrus)  
*Na de vorst – feb/ mrt*
- Kwee



## STEENVRUCHTEN

- Pruim (Prunus)
- Kers
- Abrikoos
- Perzik
- Morel

*Na de oogst: sep. of na de bloesem (april) ivm bloeden in de winter*



# Soorten

- P. Gieser Wildeman, langzame groeier, regelmatig snoeien voor stimuleren verjonging
- P. Rode Bredero: afhangende takken
- Pr. Opal: goed open snoeien (lucht en licht, ziekte), teveel vrucht weghalen
- P. Conference, zwak tot sterke groeier, tijdig verjongen. Veel ziekte



# Perzik (steenvrucht)

- Perzik: onderhoud 1x jr of 1 x 2 jr rond de bloei
- Eenjarig hout → vrucht
- Vruchtdunning: mei/juni
- Verhouding blad/vrucht
- Als in voorjaar/ zomer remt groei
  - opslag
- Als in winter: bevordert groei

# Vijg

- 1<sup>e</sup> jaar en gedragen takken (op 2 ogen) – november of december
- 2<sup>e</sup> jaar e.v. feb / mrt , gedragen takken
- Niet te laat → bloeden
- Plant in rust, blad gevallen
- Lange loten terug knippen (anders blad ontwikkeling)
- Verkeerd geplaatste takken

# Kweeper

- Langzame groeier, stevige takken dragen veel fruit, weinig snoei
- 1<sup>e</sup> jaren (kl) zijtakken knippen → gestel vormen
- Later alleen lange takken en nog later alleen verkeerd geplaatst hout
- Doel: Open kroon
- Nov – dec feb / mrt; begin bloei

# Fruit struiken

- Zwarte bes (geurige takken),  
begin er mee na oktober → tijd
- Kruisbes → weinig snoeien!
- Blauwe bes → weinig; alleen beschadiging

# Fruit struiken

Rode, Witte Bes

Blauwe bes (Am. Bosbes):

- Geeft vrucht op oude hout
- Snoei voor vorm, licht inval, dood, beschadigd en kruisend

Zwarte Bes:

- Verjonging elk jaar, takken in geheel (tot bodem) uitknippen. Vergroot lichtinval


# Volwassen pruim

- na 3-4 jaar -

- Snoei in de zomer juni -  
aug: open kruin,  
kruisingen,  
beschadigingen
- Behandel evt.  
snoeiwonden
- Oudere bomen ook een  
gesteltak vervangen
- Beschadigd, ziek hout
- Goudvinken eten  
knoppen!
- Loodglans via wonden
- Wondbalsem, Ecostyle

# Leifruit

- Gestel takken regelmatige afstand
- Waterlot (rechttopgaand, weghalen)
- Uitbuigen
- Aanbinden elk jaar herstellen (geen ijzerdraad)
- Bladknoppen platliggend
- Bloesemknoppen staand





# Braam

- Dragende takken; vrucht op jonge zijtakken aan de stengels van vorig jaar
- Na het dragen wegknippen (maar feb/mrt ook goed)
- Let op dat je nieuwe drager voor het volgend jaar bewaart!

## Doel:

- Voldoende zijtakken
- Vervanging hoofdtak

# Framboos

## Zomerframboos

- Meer vrucht dan herfstframboos maar beschermen tegen vogels
- Vrucht aan zijtakken op hout van vorige zomer
- Snoei: verjonging (aug - sep)

## Herfstframboos

- Prima met vogels
- Bloei op jonge 1-jarige hout
- Snoei elk jaar alle hout (najaar/ feb/mrt)
- Gebruik uitlopers voor stekken

# Klimfruit

- Druif: nov / jan  
+ zomersnoei
- Kiwi (dec/jan), vgl ook druif
- Logan bes
- Tayberry
- Japanse wijnbes - vrucht op 2 jaar oud hout, dus  
3-jarig hout snoeien (sep - okt)



# Blauwe bes

- Eerste jaren niet snoeien
- Daarna iets snoeien in feb - mrt; alleen ouder hout; verjonging
- Wel dood en ziek/ beschadigd takjes
- Te drastisch snoeien geeft 2 jaar reductie vrucht
- Bij sterke zomergroei; snoei in zomer ca 10 cm (tot 4 bladknoppen)



# Schaduw

- Zure kersen (krieken) - *Prunus cerasus*
- Herfstframbozen - *Rubus idaeus* 'Polka'
- Eetbare honingbes - *Lonicera kamschatica*
- Japanse sierkwee - *Chaenomeles japonica* 'Cido'
- Braambes - *Rubus fruticosus*
- Peren (vooral vroegrijpende rassen als leivorm)
- *Pyrus communnis* 'Clapp's Favourite', "Dubbele Flip", 'Bonne Louise d'Avranches'

# Informatie

- [www.houtwal.be](http://www.houtwal.be)
- <http://fruitabc.blogspot.com>
- [Fruitpluktuin.nl](http://Fruitpluktuin.nl)
- <http://www.hoogstamboomgaard.be/snoeien.html>